



Aplicación Foliar LIMÓN			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Nutrición del tubo polínico, floración y Cuaja.	+ Nutrafeed TopBoroCinc	2,5	Botón floral verde.
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,5 + 1,5	Brotación, crecimiento de primavera.
Disminución de clorosis	Nutrafeed TopFierro	2,0	Inducción de desarrollo vegetativo
Fotosíntesis y consistencia de fruto y cáscara.	Nutrafeed TopCalcioBoro	2,0	10 días después de la cuaja.
Fruto firme. Nutrición de Ca + B y transporte al fruto y cascara.	Nutrafeed TopCalcioBoro +Nutrafeed TopMagnesio	2,0 + 2,0	20 días después de la cuaja.
Maduración, calibre del fruto.	Nutrafeed TopPotasio +Nutrafeed Algae	3,0 + 1,0	30 días después de la cuaja.
Maduración, calibre del fruto.	Nutrafeed TopPotasio	2,0	40 días después de la cuaja.
Disminución de clorosis	Nutrafeed TopFierro	2,0	Inducción de desarrollo vegetativo pos cosecha

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl

Fertirrigación Suelo-Raíz LIMÓN			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	10 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	20 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil + Nutrafeed TopFierro*	2,0 + 2,0	35 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	50 días pos brotación aérea (floración-cuaja)
Apoyo funcionalidad raíz. Mejorar síntesis y transporte de citoquininas endógenas: mejora calibre y calidad del fruto.	Nutrasoil	2,0	15 días pos cuaja
Apoyo funcionalidad raíz	Nutrasoil	2,0	30 días pos cuaja
Inducción de raíces pos cosecha y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	3,0 + 3,0	Pos cosecha.

* Aplicaciones en suelos alcalinos