

Aplicación Foliar **VID DE MESA**

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Maduración de cloroplastos y prevención fiebre de primavera	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,5 + 1,5	20 días pos brotación o brote de 15 cm.
Prevención fiebre de primavera	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,5 + 1,5	30 días pos brotación o brote de 30-40 cm.
Nutrición inflorescencia y tubo polínico. Cuaja.	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopBoroCinc	1.5 + 2.5	10 días antes floración y hasta inicio de floración.
Grosor del hollejo o película de la baya. Sanidad del racimo.	Nutrafeed TopCobre	1,0	Pos cuaja antes de cierre de racimo sólo o mezclado con fungicida.
Grosor del hollejo o película de la baya. Sanidad del racimo.	Nutrafeed TopCobre	1,0	Repetir a los 10-12 días de la aspersión anterior. Sólo o mezclado junto al fungicida.
Aporte de Ca y B al racimo: Racimo firme	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopPotasio	1,5 + 1,5 (mínimo 2 veces cada 5-7 días).	Grano 3-4 mm junto al AG ₃ cuando corresponda.
Aporte de Ca y B al racimo: Baya y escobajo firme	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopPotasio	1,5+1,5 (mínimo 2 veces cada 5-7 días).	Grano 4-5mm junto al AG ₃ cuando corresponda.
Control palo negro o baya débil	Nutrafeed Calidad	3,0 (2 veces cada 7 días)	Antes inicio de pinta
Control palo negro o baya débil	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed Calidad	3,0 + 2,0	Pinta 20 y 30 %
Desarrollo o promoción del color rojo en de la baya.	Nutrafeed Color	3,0	Inicio de pinta (20%). Repetir a los 7 días si fuera necesario.
Mitigación de problemas fungosos, bacteriales y otros como pudrición ácida.	Nutrafeed TopCobre + botricida	1,5 + 0,3 (humectante)	En caso de condición, lluvia, garúa, neblina persistente. Repetir cada 10-12 días según situación.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl

Fertirrigación Suelo-Raíz VID DE MESA

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	10 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	20 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	50 días pos brotación aérea (floración-cuaja)
Apoyo funcionalidad raíz. Mejorar síntesis y transporte de citoquininas endógenas: mejora calibre y calidad de la baya.	Nutrasoil	2,0	15 días pos cuaja
Apoyo funcionalidad raíz	Nutrasoil	2,0	20 días pos cuaja
Apoyo funcionalidad raíz	Nutrasoil	2,0	40 días pos cuaja
Inducción de raíces pos cosecha	Nutrasoil	4,0	Pos cosecha. Fin del verano.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl