

## Aplicación Foliar **VID DE VINO**

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Maduración de cloroplastos y prevención fiebre de primavera	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,5 + 1,5	20 días pos brotación o brote de 15 cm.
Prevención fiebre de primavera	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,5 + 1,5	30 días pos brotación o brote de 30-40 cm.
Nutrición inflorescencia y tubo polínico. Cuaja.	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopBoroCinc	1.5 + 2.5	10 días antes floración y hasta inicio de floración.
Grosor del hollejo o película de la baya. Sanidad del racimo.	Nutrafeed TopCobre	1,0	Pos cuaja antes de cierre de racimo sólo o mezclado con fungicida.
Grosor del hollejo o película de la baya. Sanidad del racimo.	Nutrafeed TopCobre	1,0	Repetir a los 10-12 días de la aspersión anterior. Sólo o mezclado junto al fungicida.
Aporte de Ca y B al racimo: <b>Racimo firme</b>	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopPotasio	1,5 + 1,5 (mínimo 2 veces cada 5-7 días).	Grano 3-4 mm.
Aporte de Ca y B al racimo: <b>Baya y escobajo firme</b>	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopPotasio	1,5+1,5 (mínimo 2 veces cada 5-7 días).	Grano 4-5mm.
Maduración del racimo antocianos y polifenoles en general	Nutrafeed TopPotasio	3,0	Antes inicio de pinta
Maduración del racimo antocianos y polifenoles en general	Nutrafeed TopPotasio	3,0	Pinta 20 y 30 %
Mitigación de problemas fungosos, bacteriales y otros como pudrición ácida.	Nutrafeed TopCobre + botricida	1,5 + 0,3 (humectante)	En caso de condición, lluvia, garúa, neblina persistente. Repetir cada 10-12 días según situación.

### DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)

## Fertirrigación Suelo-Raíz VID DE VINO

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	10 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días pos brotación aérea
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	50 días pos brotación aérea (floración-cuaja)
Apoyo funcionalidad raíz. Mejorar síntesis y transporte de citoquininas endógenas: <b>mejora calidad de la baya.</b>	Nutrasoil	2,0	15 días pos cuaja
Apoyo funcionalidad raíz	Nutrasoil	2,0	20 días pos cuaja
Apoyo funcionalidad raíz	Nutrasoil	2,0	40 días pos cuaja
Inducción de raíces pos cosecha	Nutrasoil	4,0	Pos cosecha. Fin del verano.

**DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA**

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)