



Aplicación Foliar APIO			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 1,0	6 días trasplante o brotación.
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 1,0	15 días trasplante o brotación.
Fotosíntesis y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopCalcioBoro o Nutrafeed TopCalcio	2,0	25 días trasplante o brotación.
Prevención enfermedades fungosas.	Nutrafeed TopCobre O Nutrafeed Fosfito	0,75 O 1,0	30 días trasplante o brotación.
Incorporación de Hierro.	Nutrafeed TopFierro	2,0	35 días trasplante o brotación.
Fruto firme. Nutrición de Ca + B y transporte al fruto.	Nutrafeed TopCalcioBoro o Nutrafeed TopCalcio +Nutrafeed TopMagnesio	2,0 + 2,0	55 días trasplante o brotación.
Sanidad de las plantas.	Nutrafeed TopCobre	1,0	65 días trasplante o brotación.
Fruto firme. Nutrición de Ca + B y transporte al fruto.	Nutrafeed TopCalcioBoro o Nutrafeed TopCalcio	2,0	75 días trasplante o brotación.
Verdeo de hojas.	Nutrafeed TopFierro	2,0	7 días antes de cosecha.

**DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA**

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)



## Fertirrigación Suelo-Raíz APIO

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	5 días trasplante o brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	25 días trasplante o brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días trasplante o brotación.
Inducción de raíces pos cosecha y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	3,0 + 3,0	60 días trasplante o brotación.

**DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA**

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)