



Aplicación Foliar CEBOLLA			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	0,8 + 0,8	10 días trasplante o brotación.
Prevención enfermedades fungosas.	Nutrafeed Fosfito	1,5	20 días trasplante o brotación.
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	0,8 + 0,8	30 días trasplante o brotación.
Fotosíntesis y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopCalcioBoro o Nutrafeed TopCalcio	2,0	40 días trasplante o brotación.
Prevención enfermedades fungosas.	Nutrafeed TopCobre	1,0	50 días trasplante o brotación.
Fruto firme. Nutrición de Ca + B y transporte al fruto.	Nutrafeed TopCalcioBoro o Nutrafeed TopPotasio	2,0 + 2,0	60 días trasplante o brotación.
Prevención enfermedades fungosas.	Nutrafeed Fosfito	2,0	70 días trasplante o brotación.
Sanidad de las plantas.	Nutrafeed TopCobre	1,0	80 días trasplante o brotación.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl



Fertirrigación Suelo-Raíz CEBOLLA

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	5 días trasplante o brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	25 días trasplante o brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días trasplante o brotación.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	3,0 + 3,0	60 días trasplante o brotación.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	3,0 + 3,0	80 días trasplante o brotación.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl