



| Aplicación Foliar CILANTRO | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|
| Objetivos | Producto | Dosis (L/ha) | Épocas |
| Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos. | Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio | 1,0 + 1,0 | 6 días brotación. |
| Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos. | Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio | 1,0 + 1,0 | 15 días brotación. |
| Fotosíntesis y consistencia de los tejidos. | Nutrafeed TopCalcioBoro o Nutrafeed TopCalcio | 2,0 | 25 días brotación. |
| Prevención enfermedades fungosas. | Nutrafeed TopCobre O Nutrafeed Fosfito | 0,75 O 1,0 | 30 días brotación. |
| Incorporación de Hierro. | Nutrafeed TopFierro | 2,0 | 35 días brotación. |
| Activador de clorofila | Nutrafeed Algae +Nutrafeed TopMagnesio | 1,0 + 2,0 | 45 días brotación. |
| Activador de clorofila | Nutrafeed Algae +Nutrafeed TopMagnesio | 1,0 + 2,0 | 55 días brotación. |
| Verdeo de hojas. | Nutrafeed TopFierro | 2,0 | 7 días antes de cosecha. |

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl



Fertirrigación Suelo-Raíz CILANTRO

| Objetivos | Producto | Dosis (L/ha) | Épocas |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal | Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito | 2,0 +1,5 | 5 días brotación. |
| Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal | Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito | 2,0 +2,0 | 25 días brotación. |
| Acondicionamiento temprano de la raíz | Nutrasoil | 2,0 | 35 días brotación. |
| Inducción de raíces y sanidad vegetal | Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito | 3,0 + 3,0 | 60 días brotación. |

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl