



Aplicación Foliar POROTO GRANADO			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	0,7 + 0,7	5 días brotación.
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopCinc	1,0 + 1,5	15 días brotación.
Sanidad de las plantas.	Nutrafeed TopCobre	0,75	20 días brotación.
Fotosíntesis y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopBoroCinc	2,0	30 días floración.
Formación de cera y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	50 días brotación.
Fruto firme. Nutrición de Ca + B y transporte al fruto.	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopPotasio	2,0 + 3,0	60 días brotación.
Fruto firme. Nutrición de K y transporte al fruto.	Nutrafeed TopPotasio	3,0	70 días brotación.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl

Fertirrigación Suelo-Raíz POROTO GRANADO			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	5 días brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	15 días brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	25 días brotación.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 + 2,0	40 días brotación.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 + 2,0	60 días brotación.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 + 2,0	80 días brotación.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl