

# Nutrafeed<sup>®</sup> TopCincManganeso

(Cinc 6,0 % p/v y Manganeso 2,0 % p/v, quelatado con ácidos carboxílicos)

|   |
|---|
| <b>Nombre Comercial</b>                 |
| Nutrafeed <sup>®</sup> TopCincManganeso |
| <b>Nombre Químico</b>                   |
| Quelato de Cinc y Manganeso             |
| <b>Grado</b>                            |
| Agrícola                                |

## ANÁLISIS QUÍMICO

|                       |
|-----------------------|
| <b>Cinc (Zn)</b>      |
| 60 g/L (6,0 % Zn p/v) |
| <b>Manganeso (Mn)</b> |
| 20 g/L (2,0 % Mn p/v) |

## ANÁLISIS FÍSICO

|  |
|--|
| <b>Apariencia</b>  |
| Líquido Café claro   |
| <b>Densidad</b>  |
| A 20°C 1,18 - 1,22 g/cc  |
| <b>pH</b>  |
| 5 a 6  |
| <b>Toxicidad</b>   |
| Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso |
| <b>Presentación:</b>   |
| Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.                            |

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.

## DESCRIPCIÓN

**Nutrafeed<sup>®</sup> TopCincManganeso** es un fertilizante foliar correctivo que combina perfectamente el Zn y Mn. Es una formulación líquida con agentes quelatantes que facilitan su absorción y traslocación en los tejidos vasculares de la planta. Especialmente desarrollado para cultivos exigentes en ambos nutrientes como cítricos y carozos donde la deficiencia de manganeso se observa una vez corregido el Cinc.

**Nutrafeed<sup>®</sup> TopCincManganeso** es el fertilizante foliar con la combinación química ideal de cinc y manganeso para las plantas (3:1). Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común incluido los aceites.

| Producto                                       | Dosis L/há. | Etapa de aplicación                                  | Observaciones  |
|--|-------------|--|--|
| Manzano  | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       | Optimizar la aplicación mezclando con Nutrafeed Algae, Nutrafeed TopMagnesio |
| Peral  | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Kiwi   | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Vid de mesa/ vid vinífera                      | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Cerezos  | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Duraznos                                       | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Nectarines                                     | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Ciruelos                                       | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Limón, Naranja, Mandarina                      | 2-4         | Inicio brotación primavera<br>Inicio brotación otoño |  |
| Palto, olivo                                   | 2-4         | Inicio brotación primavera<br>Inicio brotación otoño |  |
| Nogal, almendro avellano                       | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Frambuesa, arándano                            | 2-4         | Desde brotación y postcosecha.                       |  |
| Tomate, pimentón                               | 2-3         | Desde brotación                                      |  |
| Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.        | 2-3         | Desde brotación                                      |  |
| Flores   | 2-3         | Desde brotación                                      |  |
| Papa   | 2-4         | Desde brotación                                      |  |
| Otros cultivos ( cereales, industriales, etc.) | 2-3         | Desde brotación                                      |  |