

Nutrafeed® Multimíneral

(12% N, 4% P₂O₅, 7% K₂O + M.E.)

Nombre Comercial
Nutrafeed® Multimíneral
Nombre Químico
Multimíneral Quelatado
Grado
Agrícola

ANÁLISIS QUÍMICO

Nitrógeno (N)
120 g/L (12 % N p/v)
Fósforo (P₂O₅)
40 g/L (4 % P ₂ O ₅ p/v)
Potasio (K₂O)
70 g/L (7 % K ₂ O p/v)
Magnesio (MgO)
2 g/L (0,2 % MgO p/v)
Hierro
0,15 g/L (0,015 % Fe p/v)
Cinc
0,005 g/L (0,0005 % Zn p/v)
Manganeso
0,15 g/L (0,015 % Mn p/v)
Boro
0,2 g/L (0,02 % B p/v)
Cobre
0,25 g/L (0,025 % Cu p/v)
Molibdeno
0,03 g/L (0,003 % Mo p/v)

ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Amarillo Verdoso
Densidad
A 20°C 1,20 - 1,30 g/cc
pH
4,5 a 5,5
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
Presentación:
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.

DESCRIPCIÓN

Nutrafeed® Multimíneral líquido fertilizante foliar complejo, sobre la base de NPK y micronutrientes, más agentes que facilitan su absorción y translocación en los tejidos vasculares de la planta. Actúa además, como regulador de pH (ligeramente ácido) de la solución asperjante. Aumenta la masa foliar, balancea de manera eficiente el contenido nutricional de la planta.

Producto	Dosis L/há.	Etapas de aplicación	Observaciones
Manzano	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	Para potenciar su efectividad se sugiere aplicar con Algae. No aplicar en flor.
Peral	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Kiwi	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Vid de mesa/ vid vinífera	4 - 6	Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, cada 10 días, idealmente mezclado.	
Cerezos	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Duraznos	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Nectarines	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Ciruelos	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Limón, Naranja, Mandarina	3 - 5	Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, cada 10 días, idealmente mezclado.	
Palto, olivo	3 - 5	Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, cada 10 días, idealmente mezclado.	
Nogal, almendro, avellano	3 - 5	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Frambuesa, arándano	4 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días	
Tomate, pimentón	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días, durante todo el proceso vegetativo	
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días, durante todo el proceso vegetativo	
Flores	3 - 5	Aplicar semanalmente	
Papa	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días	
Otros cultivos (cereales, industriales, etc.)	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días	