

# Nutrafeed® Calcio

(Calcio 23,0 % p/v)

<b>Nombre Comercial</b>
Nutrafeed® Calcio
<b>Nombre Químico</b>
Quelato de Calcio
<b>Grado</b>
Agrícola

## ANÁLISIS QUÍMICO

<b>Calcio (CaO)</b>
230 g/L (23 % CaO p/v)

## ANÁLISIS FÍSICO

<b>Apariencia</b>
Amarillo translúcido
<b>Densidad</b>
A 20°C 1,35 - 1,38 g/cc
<b>pH</b>
5,0 a 6,0
<b>Toxicidad</b>
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
<b>Presentación:</b>
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

## DESCRIPCIÓN

**Nutrafeed® Calcio** líquido fertilizante foliar complejo, contiene calcio 23% p/v CaO quelatado y enriquecido con bases orgánicas.

Actúa además, como regulador de pH (ligeramente ácido) de la solución asperjante.

Aumenta la masa foliar, balancea de manera eficiente el contenido nutricional de la planta.

Producto	Dosis L/há.	Etapa de aplicación	Observaciones
Manzano	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, hasta inicio de cosecha.	Para potenciar su efectividad se sugiere aplicar con Algae. <b>No aplicar en flor.</b>
Peral	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, hasta inicio de cosecha.	
Kiwi	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, hasta inicio de cosecha.	
Vid de mesa/ vid vinífera	5 - 6	Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, cada 10 días, idealmente mezclado.	
Cerezos	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días.	
Duraznos	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días.	
Nectarines	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días.	
Ciruelos	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días.	
Limón, Naranja, Mandarina	4 - 5	Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, cada 10 días, idealmente mezclado.	
Palto, olivo	4 - 5	Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, cada 10 días, idealmente mezclado.	
Nogal, almendro, avellano	4 - 5	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días.	
Frambuesa, arándano	5 - 6	Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 10 días.	
Tomate, pimentón	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días, durante todo el proceso vegetativo.	
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días, durante todo el proceso vegetativo.	
Flores	3 - 5	Aplicar semanalmente.	
Papa	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días.	
Otros cultivos ( cereales, industriales, etc.)	3 - 5	Aplicar desde 6 hoja verdadera, repetir cada 10 días.	

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.