

Nutrafeed[®] Induktor Magnesio

(Fósforo 20 % p/v, Magnesio 5,5 % p/v) + Ácido Hidróxibenzoico

Nombre Comercial
Nutrafeed [®] Induktor Magnesio
Nombre Químico
Fosfito de Magnesio
Grado
Agrícola

ANÁLISIS QUÍMICO

Fósforo (P₂O₅)
200 g/L (20,0 % P ₂ O ₅ p/v)
Óxido de Magnesio (MgO)
55 g/L (5,5 % MgO p/v)

ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido Amarillo
Densidad
A 20°C 1,25 - 1,30 g/cc
pH
1,0 a 2,0
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
Presentación:
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

Nutrafeed[®] Induktor Magnesio contiene Fosfito de Magnesio (25,5 % p/v), enriquecido con Ácido Hidróxibenzoico, lo que le da un doble efecto de Resistencia Sistémica Adquirida, estimulando fitoalexinas

Está formulado para prevenir y corregir deficiencias de Magnesio en plantas, durante los períodos de máximo desarrollo vegetativo y madurez de la fruta..

Producto	Dosis L/há.	Etapa de aplicación
Manzano y peral	2 - 4	Aplicar en prefloración, cuaja y desarrollo de frutos.
Kiwi	2 - 4	Aplicar en prefloración, cuaja y desarrollo de frutos.
Vid de mesa/ vid vinífera	2 - 4	Aplicar en prefloración, cuaja y desarrollo de frutos.
Cerezos	2 - 4	Aplicar al inicio de actividad vegetativa repetir durante el ciclo del cultivo.
Duraznos	2 - 4	Aplicar al inicio de actividad vegetativa repetir durante el ciclo del cultivo.
Nectarines	2 - 4	Aplicar al inicio de actividad vegetativa repetir durante el ciclo del cultivo.
Ciruelos	2 - 4	Aplicar al inicio de actividad vegetativa repetir durante el ciclo del cultivo.
Limón, Naranja, Mandarina	2 - 4	Aplicar al inicio de actividad vegetativa repetir durante el ciclo del cultivo.
Palto	2 - 4	Aplicar al inicio de actividad vegetativa repetir durante el ciclo del cultivo.
Nogal, almendro avellano	2 - 4	Aplicar al inicio de actividad vegetativa repetir durante el ciclo del cultivo.
Frambuesa, arándano	2 - 4	Aplicar en prefloración, cuaja y desarrollo de frutos.
Tomate, pimentón	2 - 4	Hacer aplicación al momento de trasplante, repetir durante el ciclo del cultivo.
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	2 - 4	Hacer aplicación al momento de trasplante, repetir durante el ciclo del cultivo.
Flores	2 - 4	Hacer aplicación al momento de trasplante, repetir durante el ciclo del cultivo.
Papa	2 - 4	Hacer aplicación al momento de trasplante, repetir durante el ciclo del cultivo.
Otros cultivos (cereales, industriales, etc.)	2 - 4	Hacer aplicación al momento de trasplante, repetir durante el ciclo del cultivo.

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.