

# Nutrafeed<sup>®</sup> Induktor Cinc

(Fósforo 20,0 % p/v, Cinc 6,0 % p/v) + Ácido Hidróxibenzoico

Nombre Comercial
Nutrafeed <sup>®</sup> Induktor Cinc
Nombre Químico
Fosfito de Cinc
Grado
Agrícola

## ANÁLISIS QUÍMICO

Fósforo (P2O5)
200 g/L (20,0 % P2O5 p/v)
Cinc (Zn)
60 g/L (6,0 % Zn p/v)

## ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido amarillo
Densidad
A 20°C 1,25 - 1,30 g/cc
pH
1,5 a 2,5
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
Presentación:
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.

## DESCRIPCIÓN

**Nutrafeed<sup>®</sup> Induktor Cinc** contiene Fosfito de Cinc (26,0 % p/v), formulado para prevenir y corregir deficiencias de Cinc en las plantas.

Enriquecido con Ácido Hidróxibenzoico lo que potencia el efecto de RSA, estimulando fitoalexinas. Posee doble sistemía: ascendente y descendente.

Su formulación favorecer el desarrollo foliar, floración, cuajado y maduración de los frutos.

Producto	Dosis L/há.	Etapa de aplicación
Manzano y peral	1 - 2	Aplicar en desde prefloración a desarrollo de frutos.
Kiwi	1 - 2	Aplicar en desde prefloración y repetir según necesidad.
Vid de mesa/ vid vinífera	1 - 2	Aplicar en desde prefloración y repetir según necesidad.
Cerezos	1 - 2	Aplicar en postcosecha .
Duraznos	1 - 2	Aplicar desde febrero cada 20 días.
Nectarines	1 - 2	Aplicar desde febrero cada 20 días.
Ciruelos	1 - 2	Aplicar desde febrero cada 20 días.
Limón, Naranja, Mandarina	1 - 2	Aplicar en prefloración y repetir cada 15 - 20 días.
Palto, olivo	1 - 2	Aplicar en prefloración y repetir cada 15 - 20 días.
Nogal, almendro, avellano	1 - 2	Aplicar desde febrero cada 20 días.
Frambuesa, arándano	1 - 2	Aplicar desde febrero cada 20 días.
Tomate, pimentón	1 - 2	Repartir un mínimo de 3 - 4 aplicaciones cada 15 - 20 días a lo largo del cultivo. En presencia de afección: cada 7 a 10 días
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	1 - 2	Repartir un mínimo de 3 - 4 aplicaciones cada 15 - 20 días a lo largo del cultivo. En presencia de afección: cada 7 a 10 días
Flores	1 - 2	Repartir un mínimo de 3 - 4 aplicaciones cada 15 - 20 días a lo largo del cultivo. En presencia de afección: cada 7 a 10 días
Papa	1 - 2	Repartir un mínimo de 3 - 4 aplicaciones cada 15 - 20 días a lo largo del cultivo. En presencia de afección: cada 7 a 10 días
Otros cultivos ( cereales, industriales, etc.)	1 - 2	Repartir un mínimo de 3 - 4 aplicaciones cada 15 - 20 días a lo largo del cultivo. En presencia de afección: cada 7 a 10 días