

# Terrafeed® Cinc

(Zn 7% p/v)

<b>Nombre Comercial</b>
Terrafeed® Cinc
<b>Nombre Químico</b>
Quelato de Cinc
<b>Grado</b>
Agrícola

## ANÁLISIS QUÍMICO

<b>Cinc (Zn)</b>
70 g/L (7% Zn p/v)

## ANÁLISIS FÍSICO

<b>Apariencia</b>
Líquido Café
<b>Densidad</b>
A 20°C 1,10 - 1,15 g/cc
<b>pH</b>
4,0 - 5,0
<b>Toxicidad</b>
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
<b>Presentación:</b>
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

## DESCRIPCIÓN

**Terrafeed® Cinc** está formulado como concentrado soluble de alta pureza, contiene Cinc quelatado (7% Zn p/v). Es formulado para prevenir y corregir deficiencias de cinc en los cultivos. Ha sido diseñado para aplicaciones edáficas mejorando las condiciones nutritivas de las plantas, el cinc es necesario durante la temporada de crecimiento de hojas, frutos y brotes. El Cinc se traslada a la madera como reserva para la temporada siguiente.

Producto	Dosis L/há.	Etapa de aplicación	Observaciones
Manzano	20 - 50	Aplicar desde puntas verdes.	Para <b>OPTIMIZAR</b> su aplicación se puede mezclar con línea Amino TerraFeed
Peral	20 - 50	Aplicar desde puntas verdes.	
Kiwi	20 - 50	Aplicar desde puntas verdes.	
Vid de mesa/ vid vinífera	20 - 50	Aplicar con brotes de 20 a 30 cm. antes de flor.	
Cerezos	20 - 50	Aplicar desde inicio de flor a caída de chaqueta.	
Duraznos	20 - 50	Aplicar desde puntas verdes a brotes de 5 cm.	
Nectarines	20 - 50	Aplicar desde puntas verdes a brotes de 5 cm.	
Ciruelos	20 - 50	Aplicar desde inicio de flor a caída de chaqueta.	
Limón, naranja, mandarina	20 - 60	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes.	
Palto, olivo	20 - 60	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes.	
Nogal, almendro, avellano	20 - 60	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes.	
Frambuesa, arándano	20 - 30	Aplicar antes de floración.	
Tomate, pimentón	20 - 30	Aplicar desde 6 hojas en adelante.	
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	20 - 30	Aplicar desde 6 hojas en adelante.	
Flores	20 - 30	Aplicar en inicio de temporada, antes de floración.	
Papa	20 - 30	Aplicar desde 6 hojas en adelante.	
Otros cultivos ( cereales, industriales, etc.)	20 - 30	Aplicar desde 6 hojas en adelante.	

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.