NUTRAfeed®
FERTILIZANTES FOLIARES DE ALTA EFICIENCIA

FICHA TÉCNICA
DEPARTAMENTO TÉCNICO NUTRAFEED

Las Palmas 167, San Bernardo
Santiago - Chile
Fono/Fax: (56) 2 2857 3250
www.nutrafeed.cl

Nutrafeed® InduKtor 30-20

(Fósforo 30,0 % p/v, Potasio 20,0 % p/v) + Ácido Hidróxibenzoico

Nombre Comercial
Nutrafeed® InduKtor 30-20
Nombre Químico
Fosfito de Potasio
Grado
Agrícola

ANÁLISIS QUÍMICO

Fósforo (P_2O_5)
300 g/L (30,0 % P2O5 p/v)
Potasio (K_2O)
200 g/L (20,0 % K2O p/v)

ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido amarillo
Densidad
A 20°C 1,30 - 1,35 g/cc
pH
5,5 a 6,0
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
Presentación:
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.

DESCRIPCIÓN

Nutrafeed® InduKtor 30-20 Es un producto enriquecido con Ácido Hidróxibenzoico, lo que potencia el efecto de Resistencia Sistémica Adquirida, estimulando fitoalexinas. Posee doble sistemia: ascendente y descendente.

Su formulación está estudiada para favorecer el desarrollo de la planta y tolerar el estrés causados por agentes bióticos y ambientales. La presencia de Potasio en su composición previene y/o cura la deficiencia de estos elementos en la planta, factor a tener en cuenta, sobre todo, en los períodos de máximo demanda de éste elemento.

Producto	Dosis L/há.	Etapa de aplicación
Manzano y peral	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Kiwi	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Vid de mesa/ vid vinífera	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Cerezos	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Duraznos	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Nectarines	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Ciruelos	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Limón, Naranja, Mandarina	2 - 5	Aplicar cuando las condiciones de humedad lo ameriten.
Palto, Olivo	2 - 5	Aplicar cuando las condiciones de humedad lo ameriten.
Nogal, almendro, avellano	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Frambuesa, arándano	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Tomate, pimentón	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 10 a 12 días.
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 10 a 12 días.
Flores	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 10 a 12 días.
Papa	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 10 a 12 días.
Otros cultivos (cereales, industriales, etc.)	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 10 a 12 días.