

# Nutrafeed<sup>®</sup> InduKtor 28-26

(Fósforo 28,0 % p/v, Potasio 26,0 % p/v) + Ácido Hidróxibenzoico

<b>Nombre Comercial</b>
Nutrafeed <sup>®</sup> InduKtor 28-26
<b>Nombre Químico</b>
Fosfito de Potasio
<b>Grado</b>
Agrícola

## ANÁLISIS QUÍMICO

<b>Fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>
280 g/L (28,0 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> p/v)
<b>Potasio (K<sub>2</sub>O)</b>
260 g/L (26,0 % K <sub>2</sub> O p/v)

## ANÁLISIS FÍSICO

<b>Apariencia</b>
Transparente
<b>Densidad</b>
A 20°C 1,30 - 1,35 g/cc
<b>pH</b>
6,0 a 7,0
<b>Toxicidad</b>
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
<b>Presentación:</b>
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.

## DESCRIPCIÓN

Está enriquecido con Ácido Hidróxibenzoico, lo que potencia el efecto de Resistencia Sistémica Adquirida, estimulando fitoalexinas. Posee doble sistema: ascendente y descendente. Su formulación está estudiada para favorecer el desarrollo de la planta y tolerar el estrés causado por agentes bióticos y ambientales. La presencia de Potasio en su composición previene y/o cura la deficiencia de estos elementos en la planta, factor a tener en cuenta, sobre todo, en los períodos de máximo demanda de éste elemento.

Producto	Dosis L/há.	Etapa de aplicación
Manzano y peral	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Kíwi	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Vid de mesa/ vid vinífera	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Cerezos	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Duraznos	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Nectarines	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Ciruelos	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Limón, Naranja, Mandarina	2 - 5	Aplicar cuando las condiciones de humedad lo ameriten.
Palto, Olivo	2 - 5	Aplicar cuando las condiciones de humedad lo ameriten.
Nogal, almendro avellano	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Frambuesa, arándano	2 - 5	Aplicar en flush de crecimiento de raíces.
Tomate, pimentón	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 7 a 10 días.
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 7 a 10 días.
Flores	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 7 a 10 días.
Papa	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 7 a 10 días.
Otros cultivos ( cereales, industriales, etc.)	2 - 5	Aplicar en almaciguera, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 7 a 10 días.